



PROTOCOLE D'INTERVENTION À DOMICILE – BACTÉRIE MULTIRÉSISTANTE

Matériel à utiliser

- Gants à usage unique
- Blouse de protection à usage unique (ou blouse lavable dédiée)
- Solution hydroalcoolique
- Sac poubelle pour déchets (voir annexe jointe « Tri déchet activités de soins »)
- Produits d'entretien désinfectants (conformes aux recommandations internes)
- Matériel de ménage dédié
- Sac pour linge sale

Définition – Objectifs

Intervention au domicile d'une personne porteuse d'une bactérie multi-résistante.

Il s'agit :

- D'assurer un accompagnement sécuritaire à domicile.
- De réaliser des tâches de ménage et d'entretien du linge dans des conditions d'hygiène strictes.
- De protéger les professionnels comme la personne accompagnée.

Procédure

À l'arrivée :

- Se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique.
- Enfiler les équipements de protection individuelle (EPI) :
 - Blouse de protection
 - Gants à usage unique

Pendant l'intervention :

Ménage :

- Utiliser le matériel de ménage dédié à la personne.
- Nettoyer en allant du plus propre au plus sale (ex. : plans de travail avant les sols).
- Désinfecter les surfaces fréquemment touchées : poignées, interrupteurs, télécommandes...
- Utiliser les produits désinfectants.

Entretien du linge :

- Manipuler le linge avec des gants.
- Ne pas secouer le linge pour éviter la dispersion des agents infectieux.
- Lavage à 60°C minimum si le tissu le permet.

À la fin de l'intervention :

- Retirer les gants (en les retournant).
- Se désinfecter les mains.
- Retirer la blouse.
- Se désinfecter à nouveau les mains.
- Nettoyer ou désinfecter le petit matériel utilisé si réutilisable.
- Signaler les actions réalisées dans le cahier de liaison numérique « Dôme »
- Évacuation des déchets :
 - ✓ L'IDEL s'engage à jeter dans un premier sac poubelle fermé les déchets liés aux soins, puis à le mettre dans la poubelle ménagère du domicile
 - ✓ Evacuer la poubelle ménagère, en veillant à bien fermer le sac, dans le container à poubelles installé à proximité du domicile chaque jour à la fin de la dernière intervention

Contre-indications

- Refus de l'intervention par la personne (non-consentement).
- Symptômes infectieux graves nécessitant un relais médical urgent.
- Absence d'EPI ou matériel de désinfection adapté.

Évaluation

- Satisfaction : La personne accepte l'intervention et en comprend les enjeux.
- Sécurité : Le matériel utilisé est conforme, et les gestes de protection sont respectés.
- Confort : L'intervention est réalisée avec douceur et respect.
- Efficacité : Les consignes d'hygiène sont suivies, les surfaces et le linge sont traités.
- Transmissions : L'intervention est tracée (Cahier de liaison numérique « Dôme »).